

IHO-/
VAH-gelistet



Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

baua: Reg.-Nr. N-37416, N-37417

Desinfektionsmittel 100 g enthalten:

35,3 g Propanol-1-ol, 29,7 g Ethanol

Verkaufseinheiten:

Art. Nr.	VKE/Inhalt
2110813	1 Flasche à 750 ml (1 Krt. à 12 Fla.)

Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Flam Liq.	3	H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Eye Irrit.	2	H319-Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE	3	H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



Achtung

H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319-Verursacht schwere Augenreizung. H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261-Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. P280-Augenschutz tragen. P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P403+P233-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

SCHNELLEDESINFEKTION

Flächendesinfektion auf Alkoholbasis

Einsatzbereich:

- zuverlässige und wirkungsvolle Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen und Geräte im industriellen und öffentlichen Bereich

Produkteigenschaften:

- mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren
- keine Gefahr von Resistenzerscheinungen
- verdunstet rückstandsfrei
- geprüft und erfolgreich begutachtet nach DIN EN 13697
- VAH- und IHO-gelistet
- Materialverträglichkeit: Bei sachgemäßem Einsatz auf allen alkoholbeständigen Materialien anwendbar. Nicht geeignet für Plexiglas und Acrylat-Kunststoffe.

Anwendung/Dosierung:

- gebrauchsfertige Lösung unverdünnt auf die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände aufsprühen
- Einwirkzeit: gem. VAH: mindestens 5 Minuten; gem. DIN EN 13697: ab 30 Sekunden
- Dosierung: Für eine wirksame Desinfektion ist im Regelfall der Einsatz von 40 ml Gebrauchslösung pro m² Oberfläche notwendig.

Wirkung	Dosierung	Abtötungszeit
Bakterizidie (EN 13697)	anwendungsfertig auftragen	30 Sekunden
Levurozidie (EN 13697)	anwendungsfertig auftragen	30 Sekunden
Viruzidie (EN 14476)	anwendungsfertig auftragen	30 Sekunden

ACHTUNG: Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.

Lagerung: Vor Sonneneinstrahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen!

Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.